

NEUMOCILIN



NEUMOCILIN

Inyectable. Expectorante, bronco dilatador, mucolítico
Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q 0040 056
Uso verterinario

FORMULA: Cada ml contiene:

Alcanfor	_____	60 mg
Mentol	_____	60 mg
Yodoformo	_____	40 mg
Aceite de niauli	_____	0.01 ml
Alcohol bencilico	_____	0.04 ml
Vehiculo c.b.p.	_____	1 ml



DESCRIPCION: Neumocilin es un expectorante, bronco-dilatador y mucolítico (permite la fluidez del moco y flema), por asociación de elementos de función específica.

ACCION: Los componentes del neumocilin producen una licuefacción del moco en las vías respiratorias aumentando hasta en un 400% la movilización del material mucoso (expectorante), provocando hipertemia en las mucosas respiratorias afectadas y aumentando la secreción.

INDICACIONES: Antiséptico, mucolítico, expectorante y antiflogístico de las vías respiratorias: neumonía, fiebre de embarque, difteria, influenza, tos y estados de alergia.

VIA DE ADMINISTRACION: Únicamente intramuscular.

DOSIFICACION: Grandes especies, 10 a 20 ml, pequeñas especies, 1 a 5 ml, diariamente durante 5 a 7 días.

ADVERTENCIA: Esta preparación puede enturbiarse con el frío, pero volverá a clarificarse con el calor.

PRESENTACION: Frascos de 20 ml y 100 ml.