



# PASTA DESCORNADORA

PASTA DESCORNADORA

Pasta para decornar terneros y becerros  
Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-0040-054  
Uso veterinario

**FORMULA:** Cada 100 g contienen:

Hidróxido de sodio _____	44.5 g
Hidróxido de calcio _____	17.8 g
Excipiente c.b.p. _____	100 g



**DESCRIPCION:** Es un producto cáustico que altera la formación y neoformación de tejidos.

**ACCION:** La pasta descornadora Wittney es muy fácil de usar. Una pequeña cantidad, de pasta aplicada con la hoja de una navaja o por medio de una espátula en el nacimiento del cuerno, produce una reacción química la cual mata el crecimiento del mismo, esta acción provoca la aparición de una pequeña costra que se desprende en pocos días.

La pasta descornadora permite evitar el daño causado por las cornadas entre los animales de un hato, además de facilitar el manejo de los animales.

**INDICACIONES:** Para descornar terneros y becerros.

**VIA DE ADMINISTRACION:** Tópica

**DOSIFICACION:**

Terneros de 1 semana de edad.- Aplique suficiente pasta descornadora en una superficie de aproximadamente 1.5 cm. de diámetro.

Terneros de 1 semana a un mes.- Aplique suficiente pasta descornadora en una superficie de aproximadamente 2 cm. de diámetro.

Becerros de 1 a 2 meses.- si los cuernos han empezado a crecer, raspe con una lima alrededor del mismo y en el lugar donde se junta con la piel sin producir hemorragia aplicando en el anillo formado mayor cantidad de pasta descornadora que para los animales más jóvenes.

**ADVERTENCIAS:** Después del tratamiento los animales no deben estar expuestos a la lluvia, por lo menos durante un lapso de seis horas. Igualmente, las crías deberán separarse de las madres por 30 minutos, para evitar que se froten y se desprenda la pasta.

Únicamente para uso externo, extremadamente cáustico.

**PRESENTACION:** Tarro de 100 g (tratamiento para 40 a 60 cabezas).